

磁振造影(MRI)注射顯影劑檢查後注意事項

檢查日期： 年 月 日

1. 注射磁振造影顯影劑是相當安全的，注射後 80 分鐘，大約一半的劑量可經由腎臟排出，絕大多數的人無任何特殊感覺或不適，一般而言，只要是腎功能正常，均可使用。
2. 檢查後請多喝開水(1500~2000c)以利顯影劑排出，一切作息完全正常可正常進食。
3. 哺乳中婦女建議間隔 48 小時後再進行哺乳。
4. 若有身體不適的情形，可能為過敏反應這種情形在臨床上一般極為少見，請告知工作人員。

致 受檢者，以上說明。

高禾醫院健康檢查中心關心您

磁振造影(MRI)注射顯影劑檢查後注意事項

檢查日期： 年 月 日

1. 注射磁振造影顯影劑是相當安全的，注射後 80 分鐘，大約一半的劑量可經由腎臟排出，絕大多數的人無任何特殊感覺或不適，一般而言，只要是腎功能正常，均可使用。
2. 檢查後請多喝開水(1500~2000c)以利顯影劑排出，一切作息完全正常可正常進食。
3. 哺乳中婦女建議間隔 48 小時後再進行哺乳。
4. 若有身體不適的情形，可能為過敏反應這種情形在臨床上一般極為少見，請告知工作人員。

致 受檢者，以上說明。

簽名：

高禾醫院健康檢查中心關心您