

電腦斷層攝影注射顯影劑檢查後衛教

出檢查室時間:

檢查日期: 年 月 日

- 一、檢查結束後請您休息 **15 分鐘** 觀察有無過敏反應，若沒有過敏反應護理人員會幫您拔除靜脈留置針，無不適再離開。
- 二、在休息過程中，隨時注意是否有過敏不良反應出現，例如：起疹子、頭暈、寒顫、胸悶、呼吸困難、聲音沙啞等，如出現以上過敏反應，應立即告知醫護人員。
- 三、檢查結束後請**多喝開水(1500~2000c)**以利顯影劑排出，返家後即可恢復日常生活。
- 四、哺乳中婦女建議間隔 **48 小時** 後再進行哺乳。
- 五、查後若有任何問題，請您與健管師聯絡；檢查完畢後依照回診時間，再回診間看報告。
- 六、有服用慢性病藥物者，檢查完後即可正常服用，另有服用糖尿病藥物含 **Metformin** 者，查後需**停藥 48 小時**。

致受檢者，以上說明。

高禾醫院放射科關心您

電腦斷層攝影注射顯影劑檢查後衛教

出檢查室時間:

檢查日期: 年 月 日

- 一、檢查結束後請您休息 **15 分鐘** 觀察有無過敏反應，若沒有過敏反應護理人員會幫您拔除靜脈留置針，無不適再離開。
- 二、在休息過程中，隨時注意是否有過敏不良反應出現，例如：起疹子、頭暈、寒顫、胸悶、呼吸困難、聲音沙啞等，如出現以上過敏反應，應立即告知醫護人員。
- 三、檢查結束後請**多喝開水(1500~2000c)**以利顯影劑排出，返家後即可恢復日常生活。
- 四、哺乳中婦女建議間隔 **48 小時** 後再進行哺乳。
- 五、檢查後若有任何問題，請您與健管師聯絡；檢查完畢後依照回診時間，再回診間看報告。
- 六、如有服用慢性病藥物者，檢查完後即可正常服用，另有服用糖尿病藥物含 **Metformin** 者，查後需**停藥 48 小時**。

致受檢者，以上說明。

簽名:

高禾醫院放射科關心您